



Community Veterinary Hospital
7865 NE 14th Place
Portland, Oregon 97211
Phone: 503-802-6800
www.oregonhumane.org

Cuidar a Su Mascota Después de la Cirugía de Esterilización o Castración

Su mascota fue esterilizada quirúrgicamente (hembra - "esterilizada", macho - "castrado"). No hay suturas que deban retirarse de la incisión, ya que las suturas internas y el pegamento tisular se disolverán por sí solos. Las hembras han recibido un pequeño tatuaje verde dentro de su incisión para indicar que han sido esterilizadas.

Por favor, mantenga a su mascota en silencio durante los próximos 7-10 días. Evite el juego brusco y el ejercicio vigoroso después de la cirugía, ya que demasiada actividad puede hacer que el sitio de la cirugía se abra o se hinche. Las mascotas deben mantenerse en el interior donde puedan mantenerse limpias, secas y calientes durante este período de recuperación. Su mascota no debe bañarse dentro de los 10 días posteriores a su cirugía.

A su mascota se le administraron analgésicos de acción prolongada junto con la cirugía de esterilización / castración. **NO LE DÉ MEDICAMENTOS HUMANOS A SU MASCOTA.** Es peligroso y puede ser fatal. Si le dieron medicamentos para administrar al animal en casa, administre según las indicaciones.

A su mascota se le puede ofrecer comida y agua después de regresar a casa. Algunas mascotas pueden tener una pérdida temporal del apetito, pero deben comenzar a comer dentro de las 24 horas posteriores a la cirugía.

Por favor, no permita que su mascota lama o mastique en el sitio de la incisión, ya que esto puede provocar una infección. Para evitar complicaciones, se puede comprar un collar electrónico en su tienda local de suministros para mascotas o en la clínica veterinaria comunitaria; OHS no proporciona collares electrónicos. Si su mascota requiere un collar electrónico, es importante que tenga el tamaño adecuado, se ajuste cómodamente y se use durante todo el tiempo que su mascota no esté supervisada. El personal minorista puede ayudarlo a seleccionar el collar electrónico apropiado.

A medida que su mascota lo permita, revise el sitio de la incisión dos veces al día para asegurarse de que se esté curando correctamente. El enrojecimiento y la hinchazón mínimos son normales los primeros días. Los signos de infección en el sitio de la incisión pueden incluir secreción verde / amarilla o rojiza, cálida al tacto, de color muy rojo, mal olor o algo que sobresale del sitio de la incisión. Si nota alguno de estos signos, llame a nuestra línea directa del **Equipo Médico al (503) 802-6800** o envíe un correo electrónico communitymed@oregonhumane.org.

En el caso de que su mascota esté experimentando un problema médico relacionado con la cirugía realizada en la Oregon Humane Society, llame al **(503) 802-6800**; estamos disponibles por teléfono de 8:00 AM a 5:00 PM los 7 días de la semana. La Oregon Humane Society evaluará y puede ofrecer tratamiento gratuito para las complicaciones postoperatorias que surjan de la cirugía con cita previa solo de lunes a viernes de 9:30 a.m. a 3:30 p.m. Puede organizar los servicios de su veterinario comunitario o de un hospital de emergencia; **sin embargo, no se realizará ningún pago o reembolso por la atención médica proporcionada por su veterinario o clínica de emergencia.**

La Oregon Humane Society no será responsable de las complicaciones derivadas de la falta de seguimiento de estas instrucciones postoperatorias, o de enfermedades contagiosas para las cuales el animal no fue vacunado adecuadamente.