



OREGON
HUMANE
SOCIETY

Community Veterinary Hospital
7865 NE 14th Place
Portland, Oregon 97211
Phone: 503-802-6800
www.oregonhumane.org

Cuidado de tu Gato Después de Esterilización o Castración

Su gato fue esterilizado quirúrgicamente (hembra - "esterilizada", macho - "castrado") hoy. No es necesario retirar suturas de la incisión, ya que las suturas internas y el pegamento tisular se disolverán por sí solos. Tanto las mujeres como los hombres reciben un pequeño tatuaje verde para indicar que han sido esterilizados.

Instrucciones Para el Cuidado en Casa:

Medicamentos: A su mascota se le administraron analgésicos de acción prolongada junto con la cirugía de esterilización/castración. **NO LE DES MEDICAMENTOS PARA HUMANOS A TU MASCOTA.** Es peligroso y puede ser fatal. Si le dieron medicamentos para administrar al animal en casa, déselo como se indica en la etiqueta.

Dieta/Alimentación: Le puede ofrecer comida y agua después de regresar a casa. Algunas mascotas pueden tener una pérdida temporal del apetito, pero deben comenzar a comer dentro de las 24 horas posteriores a la cirugía. Por favor póngase en contacto con nosotros si su mascota tiene vómito, diarrea, o si su mascota no defeca en uno o dos días.

Monitoring: As your pet allows, check the incision site twice a day to ensure it is healing properly. Minimal redness and swelling is normal the first few days. Signs of infection at the incision site can include green/yellow or reddish discharge, warm to the touch, very red in color, bad odor or something sticking out from the incision site. If you notice any of these signs, please contact us right away.

Restricción de Actividad: Mantenga a su mascota tranquila durante los próximos 10 a 14 días. Evite el juego brusco y el ejercicio vigoroso después de la cirugía, ya que demasiada actividad puede hacer que el sitio de la cirugía se abra o se hinche. Las mascotas deben mantenerse en el interior donde puedan mantenerse limpias, secas y calientes durante este período de recuperación. Su mascota no debe ser bañada dentro de los 14 días posteriores a su cirugía. Si necesita limpiar el sitio de la cirugía, use una toallita y agua tibia. No use peróxido de hidrógeno, ungüento antibiótico ni alcohol isopropílico

Collar Isabelino: No permita que su mascota lama o mastique el sitio de la incisión, esto puede provocar una infección o la necesidad de una reparación quirúrgica. Para evitar complicaciones, se puede comprar un collar de plástico cuando recoja a su mascota o en su tienda local de artículos para mascotas. Si su mascota requiere un collar de plástico, es importante que se ajuste bien y que se use durante todo el tiempo que su mascota esté sin supervisión. Los personal del hospital puede ayudarle a seleccionar el collar de plástico adecuado

Vacunas: Si su mascota recibió una vacuna hoy, tenga en cuenta las posibles reacciones a la vacuna. La mayoría de las reacciones son leves e incluyen signos como ronchas, hinchazón de la cara, enrojecimiento o picazón en la piel, vómitos y/o diarrea. El tipo más grave de reacción alérgica, conocida como choque anafiláctico, puede provocar dificultad para respirar, o muerte. Si notas alguno de estos signos, comunícate con tu veterinario de inmediato o lleva a tu mascota a un veterinario de emergencia. Si su mascota desarrolla anafilaxia debido a una vacuna o medicamento, notifique a su veterinario antes de administrarle vacunas o medicamentos adicionales. Es posible que haya medidas que podamos tomar para prevenir una reacción con futuras vacunas. *Si esta fue la primera vacuna de tu mascota, necesitará una vacuna de refuerzo en 3-4 semanas para asegurarse de que esté completamente protegida (vacuna de FVRCP y FeLV).* Puede programarlo con nosotros o a través de su veterinario regular. Tenga en cuenta que habrá cargos adicionales por estos refuerzos

Es probable que su mascota lleve un collar de papel. Quítelo cuando llegue a casa, estos son temporales y no son seguros para usar como un collar de tela.

En caso de que su mascota experimente un problema médico relacionado con una cirugía realizada en el Community Veterinary Hospital de OHS, **llame o envíe un correo electrónico.** Estamos disponibles por teléfono y correo electrónico de 7:30 a.m. a 5:30 p.m. de Domingo a Jueves

El Community Veterinary Hospital de OHS no se hará responsable de las complicaciones derivadas del incumplimiento de estas instrucciones postoperatorias, ni de las enfermedades contagiosas para las que el animal no haya sido vacunado adecuadamente